


Препарат	Прием	Продължителност	Допълнителна информация
<a href="#">Бромхексин</a>	3 пъти по 2 таблетки	поне 15 дни	Разтваря секрета в белите дробове и подобрява функцията на сърфактанта (При сърдечни проблеми 3 пъти по 1)
Пробиотик	по 1 капсула сутрин на гладно	поне 30 дни	Подпомага чревната флора и съответно общия имунитет. Препоръчваме Биоби. Питайте в офиса на сдружението.
Селен	1 таблетка на ден (на гладно)	поне 30 дни	Хранителна добавка
Цинк	1 таблетка на ден (след хранене)	поне 30 дни	Хранителна добавка
Вит Д	10 капки на ден (по време на хранене)	поне 30 дни	3000 EU дневно - има много ефективен спрей
<a href="#">Кверцетин</a>	3 пъти по 1капсула от 100 мг или 2 капсули от 250 мг или 1 от 500 мг за	поне 15 дни, след което може да се намали дозата	Хранителна добавка
<a href="#">Байкавир</a>	3 пъти по 2 таблетки (на гладно, поне 30 мин. преди хранене)	до 8-ми ден	Противовирусен препарат, може да се използва авирон рапид и други с подобно действие
<a href="#">Артемик</a> <a href="#">Рескю</a>	5 впръсквания под езика сутрин и вечер за два дни и половина!	Най-ефективно в началото на заболяването, може да се взема дори при интубиране.	Няма го в аптеките. Пита се в офиса на сдружението.
Упсарин	По 1-2 таблетки - общо 400 мг -500 мг дневно (вечер преди лягане)	до 15-ти ден, ако няма влошаване	Разреждане на кръвта. Може да се взима в малки дози и за сваляне на температурата.
<a href="#">Дексаметазон</a>	сутрин - 4 мг до тегло 70 -80 кг, 6 мг – над това тегло	При влошаване - от 8-ми ден – по преценка на лекаря – за 5-10-15 дни	Намалява имунния отговор в цитокиновата фаза.
<a href="#">Фраксипарин</a> или <a href="#">Клексан</a>	2 пъти по 1 инжекция (0,6 мл за тегло над 70-80 кг, 0.4 мл под това тегло за 6)	При влошаване от 8 ден -за 15 дни общо. Прилага се заедно с дексаметазона.	Разреждане на кръвта. Намира се трудно. Може да се замести с <a href="#">Клексан</a> . Пита се в офиса на сдружението.
<a href="#">Еликвис</a>	2 пъти по 2,5 мг за тегло под 80 кг, 2 пъти по 5 мг за тегло над 80 кг (сутрин и вечер)	За профилактика на постковид – 3 месеца	Разреждане на кръвта.

© All Rights Reserved 2022

\* Лечението на КОВИД-19 е строго индивидуално и се извършва под постоянното наблюдение на лекар. В таблицата и графиката са представени лекарствата и хранителните добавки, които се препоръчват в нашия протокол. Те се дават в дози и време, определено от лекуващия лекар в зависимост от конкретния пациент.

Пълна версия на протокола за лечение: <https://covid19plasma.eu/wp-content/uploads/2022/01/протокол-фин-2022.pdf>



© All Rights Reserved 2022

\* Лечението на КОВИД-19 е строго индивидуално и се извършва под постоянното наблюдение на лекар. В таблицата и графиката са представени лекарствата и хранителните добавки, които се препоръчват в нашия протокол. Те се дават в дози и време, определено от лекуващия лекар в зависимост от конкретния пациент.

Пълна версия на протокола за лечение: <https://covid19plasma.eu/wp-content/uploads/2022/01/протокол-фин-2022.pdf>