

Препарат	Прием от 1 до 8 ден - леко протичане	Продължителност	Допълнителна информация
Бромхексин	3 пъти по 2 таблетки	15 дни	Разтваря секрета в белите дробове и подобрява функцията на сурфактанта (При сърдечни проблеми 3 пъти по 1)
Пробиотик	по 1 капсула сутрин на гладно	поне 30 дни	Подпомага чревната флора и съответно общия имунитет. Препоръчваме Биоби. Питайте в офиса на сдружението.
Селен	1 таблетка на ден (на гладно)	поне 30 дни	Хранителна добавка
Цинк	1 таблетка на ден (след хранене)	поне 30 дни	Хранителна добавка
Вит Д	10 капки на ден (по време на хранене)	поне 30 дни	Препоръчително е да се измери нивото, поне 3000 EU дневно - има много ефективен спрей
Кверцетин	3 пъти по 1капсула от 100 мг или 2 капсули от 250 мг или 1 от 500 мг	поне 15 дни, след което може да се намали докато свърши	Хранителна добавка, която може да се взема и за профилактика
Байкавир или авирон рапид	По схема 3 пъти по 2 таблетки (на гладно, поне 30 мин. преди хранене)	до 8-ми ден	Противовирусни препарати, които се приемат докато има вирус в организма
Упсарин или друг аспирин	По 1-2 таблетки - общо 400 мг -500 мг дневно (вечер преди лягане)	до 8 ден, ако няма влошаване	Разреждане на кръвта. Може да се взима и за сваляне на температурата.
Артемик рескю	по желание		
Артемик съпорт	по желание		

© All Rights Reserved 2022

* Лечението на КОВИД-19 е строго индивидуално и се извършва под постоянното наблюдение на лекар. В таблицата и графиката са представени лекарствата и хранителните добавки, които се препоръчват в нашия протокол. Те се дават в дози и време, определено от лекуващия лекар в зависимост от конкретния пациент.

Пълна версия на протокола за лечение: <https://covid19plasma.eu/wp-content/uploads/2022/07/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-10-%D1%8E%D0%BB%D0%B8-22.pdf>

Сдружение „Лечение на COVID-19 с реконвалесцентна плазма“

Препарат	Втори период	Продължителност	Допълнителна информация
	Прием от 8 до 21 ден при липса на симптоми. Продължава се с всички посочени по-горе медикаменти, като аспирин се заменя с аспирин протект и клопидрогел.		Задължителна консултация с лекар
Аспирин протект	1 таблетка вечер преди лягане	До 21 ден	Задължителна консултация с лекар
Клопидрогел	1 таблетка сутрин	До 21 ден	
	Прием от 21 до 90 ден при леко протичане. Довършват се всички медикаменти в посочените срокове.	Продължителност	Допълнителна информация
Клопидогрел	1 таблетка вечер	3 месеца	Задължителна консултация с лекар
	Прием от 8 до 21 ден при влошаване.		
	Измерване на Д Димери и ако са високи, заместване на аспирина с орални антикоагуланти по схема.		Задължителна консултация с лекар
	Прием от 8 до 21 ден при задух и спадане на сатурацията – включване на инжекционни антикоагуланти и кортикостероиди по схема.		Задължителна консултация с лекар

© All Rights Reserved 2022

* Лечението на КОВИД-19 е строго индивидуално и се извършва под постоянното наблюдение на лекар. В таблицата и графиката са представени лекарствата и хранителните добавки, които се препоръчват в нашия протокол. Те се дават в дози и време, определено от лекуващия лекар в зависимост от конкретния пациент.

Пълна версия на протокола за лечение: <https://covid19plasma.eu/wp-content/uploads/2022/07/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-10-%D1%8E%D0%BB%D0%B8-22.pdf>

© All Rights Reserved 2022

* Лечението на КОВИД-19 е строго индивидуално и се извършва под постоянното наблюдение на лекар. В таблицата и графиката са представени лекарствата и хранителните добавки, които се препоръчват в нашия протокол. Те се дават в дози и време, определено от лекуващия лекар в зависимост от конкретния пациент.

Пълна версия на протокола за лечение: <https://covid19plasma.eu/wp-content/uploads/2022/07/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-10-%D1%8E%D0%BB%D0%B8-22.pdf>